

گلو مثل چهار راهی است که عقب دهان و بینی را به حنجره و مری وصل می کند.



- لوزه ها در بالای گلو قرار داشته و در سنین کودکی به دفاع در مقابل حمله عفونتها کمک می کند.
 - تورم و التهاب لوزه ها در کودکان بسیار شایع می باشد زیرا لوزه های آنها بزرگتر می باشد.
 - لوزه ها با افزایش سن کودک به تدریج کوچکتر می گردند. التهاب گلو بیشتر در بزرگسالان دیده می شود.
 - با اینحال هم التهاب گلو و هم التهاب لوزه ها می توانند با یکدیگر در کودکان و بزرگسالان دیده شوند.
 - لوزه ها قسمتی از سیستم لنفوی بدن هستند که در همکاری با بقیه اعضا در سیستم دفاعی بدن نقش ایفا میکنند.
 - آنچه مهم است این واقعیت است که برداشتن آنها باعث نقص در سیستم ایمنی نخواهد شد
- لوزه سوم یا لوزه حلقی در قسمت عقب بینی قرار داشته و در معاینه ی معمولی دهان و حلق قابل رویت نیست



- برای تشخیص لوزه سوم در صورت لزوم از عکس رادیولوژی کمک گرفته می شود.
- بزرگ بودن لوزه سوم می تواند منجر به گرفتگی بینی، تنفس دهانی عفونت گوش یا سینوزیت گردد.

علائم التهاب گلو التهاب لوزه ها :

- التهاب گلو و التهاب لوزه ها دارای علائم شبیه به هم هستند که این علائم شامل موارد زیر هستند.
- گلو درد
- مشکل شدن بلع و قورت دادن
- درد در گوش که ممکن است با عمل قورت دادن بدتر شود
- بزرگ شدن غدد لنفاوی در گردن
- در موارد شدید، لوزه ها ممکن است به قدری ورم نمایند که اشکال در نفس کشیدن به تدریج ایجاد شود.
- گاهی اوقات، یک آبسه (تجمع چرک) در نزدیکی یک لوزه تشکیل می شود که به آن اصطلاحاً آبسه اطراف لوزه می گویند.
- اگر التهاب گلو و یا التهاب لوزه بر اثر عفونت استرپتوکوکی ایجاد شود، در صورت درمان مناسب بیماری به نام تب روماتیسمی ایجاد می گردد.



زمان عمل برداشتن لوزه :

- عفونتهای حاد چرکی تکرار شونده لوزه ها
- هر عفونت با تب بالا در لوزه بچه ها که منجر به تشنج شود
- عفونتهای مزمن لوزه که به درمانهای دارویی جواب ندهد
- بزرگی یک طرفه لوزه مشکوک به بدخیمی
- آبسه اطراف لوزه
- وقفه تنفسی هنگام خواب و تنفس با دهان باز در شبها
- بزرگی لوزه ها در حدی که در خط وسط به هم برسند.

زمان عمل برداشتن لوزه سوم :

- عفونتهای چرکی مکرر آدنوئید
- تنفس دهانی هنگام خواب
- عفونت مزمن گوش میانی
- وقفه تنفس هنگام خواب
- اختلال در اکسیژن رسانی به سبب انسداد راه هوایی
- اختلال در بلع یا
- اختلال در رشد استخوانهای فک و صورت
- سینوزیت مزمن
- بیش از ۳ تا ۵ بار در بچه ها





پارسیان خستیه حسین ناسین

راهنمای بیمار

خود مراقبتی

جراحی برداشتن لوزه ها



واحد آموزش به بیمار

پاییز ۱۳۹۴

کد پمفلت:



- رژیم غذایی تا ۱۴ روز بعد از عمل باید هم نرم و هم سرد باشد.
- بیمار ممکن است روز دوم تا ۳۸/۵ درجه تب کند این امر طبیعی است.
- بیمار بعد از عمل به دلیل درد مختصری که شاید موقع بلع داشته باشد ممکن است کمتر غذا بخورد لذا بیمار را تشویق به غذا خوردن کنید.
- بعد از عمل بخصوص روزهای پنجم و ششم ممکن است بیمار کمی گوش درد داشته باشد که طبیعی می باشد.
- از روز دوم به بعد در محل لوزه ها قشر خاکستری رنگ بوجود می آید که قسمتی از روند التیامی می باشد.
- بوی بد دهان تا چند روز بعد از عمل طبیعی و به دلیل چرک کردن محل عمل نیست.
- تا یک ماه فعالیت ورزشی و سنگین نداشته باشد.
- شستشو و قرقره حلق با سرم های استریل.
- خونریزی مهم ترین عارضه بعد از برداشتن لوزه به حساب می آید که ممکن است تا ۱۰ روز بعد از عمل رخ بدهد.
- بخیه های داخل دهان قابل جذب است و نیاز به کشیدن ندارد.
- در صورت هر گونه خونریزی سریعاً به اورژانس مراجعه نمایید.

منبع: مطالعات اینترنتی



جراحی لوزه

برداشتن لوزه ها از داخل دهان انجام می شود خونریزی بعد از عمل لوزه

خونریزی زودرس

بلافاصله بعد از عمل باید سریعاً رگ خونریزی دهنده در اطاق عمل کنترل گردد. (ترشحات اولیه که ممکن است خونی رنگ باشد و در ۲۴ ساعت اول در دهان بیمار است غیر طبیعی نمی باشد، در صورتی که رنگ خون روشن باشد و یا حجم ترشحات زیاد باشد، بایستی به اطلاع پزشک مربوطه برسد.)

خونریزی دیر رس

یک هفته یا ده روز پس از عمل روی محل جراحی لایه ای برای ترمیم آن تشکیل می شود که در صورت اضافه شدن عفونت یا کنده شدن زودتر از موعد این لایه ممکن است خونریزی قابل توجهی پیدا شود در این قبیل موارد ضمن حفظ خونسردی بیمار را هر چه سریعتر بایستی به مرکز درمانی مربوط و پزشک متخصص رساند.

توصیه های بعد از عمل جراحی

- بیمار تا ۶ ساعت بعد از عمل بایستی از خوردن و آشامیدن اجتناب نماید.
- مصرف دارو های تجویز شده (مسکن و گاهی آنتی بیوتیک)

