

عوارض حین دیالیز

شامل:

- ۱- تهوع و استفراغ
 - ۲- گرفتگی عضلانی
 - ۳- سردرد
 - ۴- خارش
 - ۵- افت قند خون
 - ۶- واکنش حساسیتی
 - ۷- انعقاد گردش خون (لخته شدن خون)
 - ۸- اتلاف خون
 - ۹- لیز شدن خون (تخریب سلولهای قرمز خون)
 - ۱۰- درد قفسه سینه
 - ۱۱- آرتیمی های قلبی (نا منظمی شدید ضربان قلب)
 - ۱۲- آمبولی هوا (ورود هوا به عروق)
 - ۱۳- انواع سندرم ها
 - ۱۴- آنسفالوپاتی دیالیزی (اختلالات مغزی)
 - ۱۵- تغییرات فشار خون
 - ۱۶- عفونت محل دستیابی عروقی
- که در موارد مهم توضیحاتی داده می شود.



تهوع و استفراغ :

علل آن شامل:

- تغذیه حین دیالیز و یا کمتر از یک ساعت قبل از شروع دیالیز
- افت فشار خون
- علایم زودرس سندرم عدم تعادل درمان :
- اصلاح فشار خون
- تجویز داروهای ضد تهوع
- در صورت استفراغ، دهانشویه انجام شود
- پیشگیری :
- پیشگیری از افت فشار خون و سندرم عدم تعادل شدید
- عدم خوردن غذا قبل و حین دیالیز
- ۲- گرفتگی عضلانی :
- یکی از شایع ترین عوارض حین دیالیز می باشد.
- پیشگیری و درمان :
- جلوگیری از افزایش وزن بیش از ۲ کیلوگرم بین دو جلسه دیالیز



- پیشگیری از افت فشار خون
 - افزایش غلظت سدیم محلول
- ۳- سردرد :

علت:

- افت فشار خون
- استفاده از محلول دیالیز حاوی استات
- کاهش کافئین خون

درمان و پیشگیری:

- تجویز استامینوفن حین دیالیز
- کاهش سرعت دیالیز
- مصرف موز، قهوه و چای
- استفاده از محلول دیالیز بی کربنات

۴- خارش

علل آن:

- افزایش سطح فسفر سرم
- حساسیت به هپارین
- خشکی پوست

درمان:

- پماد جلدی ضد خارش کالامین
- استفاده از صافی مناسب
- عدم استحمام با آب داغ

۵- افت قند خون:

۶- عفونت محل دستیابی عروقی





بیمارستان خمینی هشیان نامین

عوارض شایع حین همودیالیز چیست؟



واحد آموزش به بیمار

تابستان ۱۳۹۴

کد پمفلت: ۶۵-ب-۹۴



- استفاده از صافی مناسب
- تجویز اکسیژن
- استفاده از مایع دیالیز سرد
- تعیین دقیق وزن خشک و کنترل وزن
- استفاده از محلول دیالیز با غلظت بالای سدیم

برگرفته از :

منبع : کتاب پرستار و نارسایی کلیه

آدرس سایت بیمارستان خمینی نامین

❖ <http://heshmatieh.mui.ac.ir>

❖ واحد آموزش به بیمار روزهای

یک شبه و سه شبه شماره

تماس : ۶۳-۴۶۲۵۹۰۶۱ داخلی

۳۰۲



۷- واکنش حساسیتی

علل آن شامل :

حساسیت به مواد سازنده صافی و محلول دیالیز

۸- لخته شدن خون

علت :

- کم بودن میزان هپارین
- بالا بودن هماتوکریت (غلظت خون)

۹- اتلاف خون

راههای اتلاف خون شامل :

- لخته شدن ست و صافی
- جدا شدن لاین ها، لوله های رابط و صافی
- هماتوم زیر جلد در محل دستیابی عروقی
- لیز خون

علت :

محلول دیالیز بیش از حد گرم و بالاتر از ۳۷ درجه سانتی گراد

۱۱- آریتمی های قلبی

علت: داروها-عوارض دیالیز-نارسایی قلبی

تدابیر پیشگیری :

- کاهش داروهای مسکن از نوع مخدر و داروهای خواب آور

- کاهش یا عدم مصرف غذا قبل یا حین دیالیز

- جلوگیری از تجویز داروهای ضد فشار خون قبل یا

حین دیالیز

