




پارسان هشتمیه حسینان نایین

چگونه از کاتتر گردنی دایم خود مراقبت نماییم




واحد آموزش به بیمار

تابستان ۱۳۹۳

باز نگری ۱۳۹۵

کد مفلت : ۱۳ - ب - ۹۳

۱۱- از واردن کردن ضربه به آن
جداً پرهیز کنید.



منبع : کتاب پرستار و دیالیز و
مطالعات اینترنتی

آدرس سایت پارسان هشتمیه نایین


<http://heshmutieh.mui.ac.ir>

واحد آموزش به بیمار روزهای یک
شنبه و سه شنبه شماره تماس :
۶۳-۶۱-۰۹۰۶۲۵۶۲ داخلی ۳۰۲

۸- بیمار در هنگام وصل به دستگاه همودیالیز و
هنگام جداشدن از دستگاه حتماً از ماسک استفاده
نماید.

۹- همیشه مواظب باشید کاتتر کشیده نشود چون در
صورت کنده شدن باعث خونریزی می شود.

۱۰- در صورتی که به هر دلیلی کاتتر در محل خود جا
به جا شده به هیچ عنوان آن را به جلو یا عقب حرکت
ندهید.



۶- بهتر است حمام کردن بیمار قبل از آمدن به بخش دیالیز انجام شود.



۷- در صورت مشاهده این علائم در محل کاتتر حتماً پزشک را در جریان قرار دهید:

- ۱- قرمزی
- ۲- درد
- ۳- سوزش
- ۴- خارش
- ۵- ترشح
- ۶- خونریزی
- ۷- تب و لرز

مواردی که بیمار برای مراقبت از کاتتر باید رعایت کند:

- ۱- پس از گذاشتن کاتتر حداقل هفته ای سه بار به مدت یک ماه باید پانسمان آن تعویض شود.
- ۲- بهتر است برای پانسمان از پماد مو پیروسین استفاده شود.
- ۳- در هنگام تعویض پانسمان محل کاتتر باید با سرم شستشو ضد عفونی گردد.
- ۴- روی محل خروج کاتتر به مدت یکماه نباید آب ریخته شود.
- ۵- در صورتی که بیمار میخواهد حمام کند، باید نهایت دقت را داشته باشد تا روی محل خروج کاتتر برای یک ماه آب نریزد.

مقدمه :

یکی از راههای دسترسی به عروق جهت دیالیز بیمار گذاشتن کاتتر گردنی توسط جراح است بیشتر در سمت راست گردن قرار می گیرد.

این کاتتر فقط برای مدت ۱ الی ۲ سال کارایی دارد و دیگر نمی توان از آن برای دیالیز استفاده کرد.

